

К ВОПРОСУ О ДРЕНИРОВАНИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ  
НА ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ ЖКТ

Сопуев А.А.<sup>1</sup>, Акматов Т.А.<sup>2</sup>, Сыдыков Н.Ж.<sup>2</sup>, Калжикеев А.А.<sup>2</sup>, Талипов Н.О.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Кыргызской Государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева,

<sup>2</sup> Национальный хирургический центр, г. Бишкек, Кыргызская Республика.

**Резюме:** В статье на основе методов доказательной медицины определена эффективность профилактического дренирования брюшной полости после операций на дистальных отделах желудочно-кишечного тракта путем сбора, интерпретации и интеграции надежных, важных и применяемых на практике доказательств, полученных в специальных медицинских исследованиях.

**Ключевые слова:** профилактическое дренирование брюшной полости, рандомизированное клиническое исследование.

ИЧЕГИ-КАРЫН ЖОЛУНУН ТӨМӨНКҮ БӨЛҮКТӨРҮНӨ ОПЕРАЦИЯ КЫЛГАНДАН КИЙ-  
ИН КУРСАК КӨНДӨЙҮН ДРЕНАЖДОО ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕЛЕРГЕ

Сопуев А.А.<sup>1</sup>, Акматов Т.А.<sup>2</sup>, Сыдыков Н.Ж.<sup>2</sup>, Калжикеев А.А.<sup>2</sup>, Талипов Н.О.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мемлекеттик медициналык академиясы,

<sup>2</sup> Улуттук хирургия борбору, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

**Корутунду:** Бул макалада далилделген медицинанын ыкмаларынын негизинде ичеги карын жолунун төмөнкү бөлүктөрүнө операция жасалгандан кийин курсак көндөйүн алдын-ала дренаждоонун натыйжалуулугу атайын медициналык изилдөөлөрдө алынган, практикада колдонулган, ишенимдүү жана маананилүү далиндерди чогултуу, интерпретациялоо жана интеграциялоо жолу аркылуу аныкталды.

**Негизги сөздөр:** курсак көңдөйүн алдын-ала дренаждоо, атайлап эмес клиникалык изилдөө.

ON THE ISSUE OF DRAINAGE OF THE ABDOMINAL CAVITY AFTER SURGERY  
ON THE DISTAL PARTS OF GASTROINTESTINAL TRACT

Sopuev AA<sup>1</sup>, Akmatov T.A.<sup>2</sup>, Sydykov N.Zh.<sup>2</sup>, Kalzhikeev A.A.<sup>2</sup>, Talipov N.O.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kyrgyz State Medical Academy n.a. I.K. Akhunbaev,

<sup>2</sup> National Surgical Center, Bishkek, the Kyrgyz Republic

**Abstract:** On the basis of evidence-based medicine methods it was determined the effect of prophylactic drainage of the abdominal cavity after surgery on the distal parts of the gastrointestinal tract through the collection, interpretation and integration of reliable, critical and applied in practice, evidence obtained in special medical research.

**Keywords:** prophylactic drainage of the abdominal cavity, a randomized clinical trial.

Профилактическое дренирование брюшной полости (ПДБП) после различных оперативных вмешательств широко практикуется в течение длительного времени в качестве эффективного метода профилактики осложнений в абдоминальной хирургии.

В течение последних 30-ти лет хирурги стали предпринимать усилия по оценке эффективности ПДБП после операций на органах брюшной полости в контролируемых рандомизированных клинических исследованиях (РКИ). Несмотря на полученные материалы, основанные на фактических данных, о спорности ПДБП во многих случаях, большинство хирургов по всему миру продолжали использовать ПДБП на регулярной основе.

В связи с этим целью нашего исследования явилось на основе методов доказательной медицины определить эффективность ПДБП после

операций на дистальных отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) путем сбора, интерпретации и интеграции надежных, важных и применяемых на практике доказательств, полученных в специальных медицинских исследованиях.

**Материал и методы исследования.** На сегодняшний день опубликовано 8 РКИ, в которых была проведена оценка эффективности дренирования брюшной полости / полости малого таза после операций на колоректальном сегменте кишечника (Табл. 1). В большинстве исследований [1, 3, 4, 6, 9, 10, 12] изучали только плановые хирургические вмешательства, только 2-х РКИ в анализ были включены неотложные операции [11, 12]. Количество экстренных хирургических вмешательств, вошедших в эти исследования, было небольшим. Эти больные в равной мере были представлены как в группе больных с

дренированием брюшной полости, так и в группе больных без дренирования брюшной полости. Во всех исследованиях имела место схожая картина послеоперационных осложнений в обеих группах сравнения. В некоторых исследованиях отмечался более высокий уровень инфицированных послеоперационных ран у дренированных больных [4, 12, 11], однако, во второй по величине многоцентровой исследовательской серии, опубликованной в последнее время, отмечены сопоставимые уровни инфицирования послеоперационной раны в обеих группах срав-

нения [9, 10]. Случаи несостоятельности анастомоза, распознанные клинически или рентгенологически в диапазоне от 1% до 23%, имели место как у больных с дренированием брюшной полости, так и у больных без дренирования брюшной полости. Однако количественная разница между двумя наблюдаемыми группами не имела статистической достоверности. Различия в уровне смертности между наблюдаемыми группами в большинстве случаев не были связаны с несостоятельностью анастомозов.

Таблица 1

Характеристика РКИ по оценке эффективности ПДБП

Автор, год	Уровень доказательности	Количество больных	Тип дренирования	Продолжительность дренирования
Hoffmann J. et al., 1987 [4]	2b	60	Открытое дренирование	5 дней
Johnson C.D. et al., 1989 [6]	2b	106	Открытое дренирование	3 дня
Hagmaeller E. et al., 1990 [3]	2b	113	Закрытое всасывание	не сообщается
Sagar P.M. et al., 1993 [11]	1b	145	Закрытое всасывание	3 или 5 дней
Sagar P.M. et al., 1995 [12]	2b	100	Закрытое всасывание	7 дней
Merad F. et al., 1998 [9]	1b	317	Закрытое всасывание	5 дней
Merad F. et al., 1999 [10]	1b	494	Закрытое всасывание	5 дней
Brown S.R. et al., 2001 [1]	2b	59	Закрытое всасывание	3 дня

После объединения данных всех 8 РКИ материал для мета-анализа включил в себя 717 больных с профилактическим дренированием брюшной полости и 673 больных без профилактического дренирования брюшной полости. Сравнительный анализ показал небольшое преимущество в результатах по отношению к количеству возникших экссудативных внутрибрюшных жидкостных скоплений и раневой инфекции в группе больных без ПДБП, однако разница в полученных результатах не была статистически достоверной. Легочные осложнения были сопоставимы в обеих группах. Кроме того, мета-анализ, проведенный Urbach с соавт. [15], показал, что лишь в 1-м из 20-ти случаев несостоятельности анастомоза кишечное содержимое или гной стали выделяться через дренаж. Это указывает на то что, дренажи имеют низкую чувствительность (5%) выявления несостоятельности анастомоза.

Учитывая разнородность сформированных анастомозов в 7-ми РКИ, задались задачей оценить эффективность ПДБПу больных после формирования тазовых и супрапромонториальных анастомозов. Анализ этих РКИ не выявил статистически достоверной разницы в количест-

ве послеоперационных осложнений между группами пациентов с ПДБПи без ПДБПу больных с тазовыми и супрапромонториальными анастомозами.

**Обсуждение**

Только хорошо продуманные РКИ с адекватными размерами выборки могут предоставить убедительные данные по оценке эффективности ПДБП для снижения и выявления послеоперационных осложнений при хирургических вмешательствах в брюшной полости. Учитывая отсутствие окончательного обзора в этой области, мы провели многосторонний анализ на основе фактических данных для подготовки рекомендаций по использованию ПДБП в хирургии ЖКТ [5].

Результаты проведенного анализа показали, что использование рутинного ПДБП после неосложненных абдоминальных операций на колоректальном участке толстой кишки не дает каких-либо преимуществ [1, 3, 4, 6, 9-12]. Во многих случаях ПДБП бесполезно, увеличивает индекс болевых ощущений и общую стоимость лечебной процедуры. Имела место положительная тенденция в пользу бездренажной тактики по отношению к меньшему количеству таких

осложнений, как послеоперационная раневая инфекция и клинически очевидная несостоятельность анастомоза. В исследованиях показано, что ПДБП обладает низкой чувствительностью при несостоятельности анастомозов и внутрибрюшных кровотечениях, ставя под сомнение предполагаемую функцию ПДБП [2, 5, 7, 8, 13, 14]. Во всех РКИ имела место высокая вариабельность продолжительности ПДБП (2-7 суток). Это указывает на потребность в будущих РКИ, которые ориентированы на длительность ПДБП, особенно для краткосрочного ПДБП (24-48 часов), которое не изучалось. Исходя из этих исследований, мы приходим к выводу что нет никаких доказательств того, что рутинное ПДБП в области колоректальных анастомозов оправдано в плановой хирургии.

**Литература:**

1. Brown SR, Seon-Choen F, Eu KW, et al. A prospective randomised study of drains in infra-peritoneal rectal anastomoses. *TechColoproctol.* 2001;5:89-92.
2. Greenall MJ, Evans M, Pollock AV. Should you drain a perforated appendix? *Br J Surg.* 1978; 65: 880-882.
3. Hagmüller E, Lorenz D, Werthmann K, et al. Uses and risks of drainage following elective colon resection. A prospective, randomized and controlled clinical study. *Chirurg.* 1990; 61: 266-271.
4. Hoffmann J, Shokouh-Amiri MH, Damm P, et al. A prospective, controlled study of prophylactic drainage after colonic anastomoses. *Dis Colon Rectum.* 1987; 30: 449-452.
5. Centre for Evidence-Based Medicine [Electronic resource]: <http://www.cebm.net> - (Accessed 2004).
6. Johnson CD, Lamont PM, Orr N, et al. Is a drain necessary after colonic anastomosis? *J R Soc Med.* 1989; 82: 661-664.
7. Liu CL, Fan ST, Lo CM, et al. Abdominal drainage after hepatic resection is contraindicated in patients with chronic liver disease. *Ann Surg.* 2004; 239: 194-201.
8. Meakins JL. Innovations in surgery: the rules of evidence. *Am J Surg.* 2002; 183: 399-405.
9. Merad F, Hay J-M, Fingerhut A, et al. Is prophylactic pelvic drainage useful after elective rectal or anal anastomosis? A multicenter controlled randomized trial. *Surgery.* 1999; 125: 529-535.
10. Merad F, Yahchouchi E, Hay J-M, et al. Prophylactic abdominal drainage after elective colonic resection and suprapromontory anastomosis. A multicenter study controlled by randomization. *Arch Surg* 1998; 133: 309-314.
11. Sagar PM, Couse N, Kerin M, et al. Randomized trial of drainage of colorectal anastomosis. *Br J Surg.* 1993; 80: 769-771.
12. Sagar PM, Hartley MN, MacFie J, et al. Randomized trial of pelvic drainage after rectal resection. *Dis Colon Rectum.* 1995; 38: 254-258.
13. Sopuev A.A., Mamakeev K.M., Mamatov N.N., Abdiev A.Sh., Ovcharenko K.E., Akmatov T.A. An experimental evaluation of the effectiveness of dissociative anti-adhesive products. // *International Journal Of Applied And Fundamental Research.* – 2015. – №1. – URL: [www.science-sd.com/460-24761](http://www.science-sd.com/460-24761).
14. Sopuev A.A., Orozobekov B.K., Mamakeev J.B., Abdiev A. Sh., Akmatov T.A., Kalzhikeev A.A. Some aspects of diagnostics and treatment in chronic colonic stasis. // *International Journal Of Applied And Fundamental Research.* – 2015. – №1. – URL: [www.science-sd.com/460-24765](http://www.science-sd.com/460-24765).
15. Urbach DR, Kennedy ED, Cohen MM. Colon and rectal anastomoses do not require routine drainage. *Ann Surg.* 1999; 229: 174-180.